



**CERTOS NO PREPARO
E ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS**

1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



2 DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO



3

PRESCRIÇÃO MÉDICA



1 PREPARO DA MEDICAÇÃO



<http://www.respond2articles.com/ANA/forums/thread/1336.aspx>



5

EVITE CONTAMINAÇÃO



6

PACIENTE



7

COMPARE O RÓTULO COM A PRESCRIÇÃO

Prescrição Médica Data Prescrição: 29/03/2017 16:03:08

HNome: 8707902 - [REDACTED]		Data Nasc: [REDACTED]		Idade: [REDACTED]					
Peso Atual: [REDACTED]		Altura Atual: [REDACTED]		Convênio: PARTICULAR					
Alergia(s):									
Hora	#	Dia	Prescrição Médica	Dose	Via	BL	Frequência	Horários	Suspender
	1		FENERGAN (Cloridrato de Prometazina) 25MG/ML - AMP - 2 ml	5 MG	INTRAMUSCULAR		3 EM 3 HORAS		
	2		BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS (Dipirona sódica 333,4 MG/ML, Bifolbrometo de Escopolamina 6,67 MG/ML) - FRA - 20 ml	39 GTS	ORAL		4 EM 4 HORAS	Imediatoh 21 01 05 09 13	
	3		A SPRINA PREVENT (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 300MG - CFR	2 CFR	ORAL		1 VEZ A O DIA	Imediatoh	

[REDACTED]
[REDACTED]

Data impressão: 28/3/2017 16:03:10 Prescrição: 903859


<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagId=272417331>



MEDICAMENTO



- Confira o medicamento
- Em caso de dúvida sobre o medicamento - NÃO ADMINISTRE
- Não misture
- Não compartilhe
- Verificar alergias



- Confira as condições de conservação do medicamento, como sinais de turvação, precipitação e Decomposição;
- Nunca administre medicamentos preparados por outras pessoas;
- Leia o rótulo do medicamento três vezes comparando com a prescrição, evitando erros ou falhas;
- Nunca administre medicamentos com rótulos ilegíveis ou sem rótulo;
- Certifique-se da data de vencimento, jamais administrando medicamento vencido, pois sua eficácia poderá ser comprometida;
- Não é aconselhável misturar medicamentos líquidos;
- Nunca se deve compartilhar medicamentos nas formas de apresentação líquida, creme, óleo ou pomada. O uso deve ser individualizado, portanto, identifique-os;
- Na dúvida sobre o medicamento, não administre-o, e peça orientação ao enfermeiro ou ao médico;
- Nas vias de administração parenteral, evite regiões que apresentem processos inflamatórios, hematomas, cicatrizes, lesões cutâneas, fístula arteriovenosa, hemiplegias e membros superiores mastectomizados.




CUIDADOS COM MEDICAMENTO



- Transporte os medicamentos sempre em bandejas e nunca nas mãos, mesmo que for administrar medicação única para um único paciente;
- Não coloque a bandeja com medicamentos sobre o berço/ leito do paciente;
- Antes de abrir uma ampola, certifique-se de que toda a medicação está no corpo dela e não no gargalo, para que não haja desperdício de medicamento;
- Realize antissepsia do gargalo com algodão embebido em álcool a 70%. Com isso, são removidos possíveis micro-organismos, evitando a contaminação;
- Realize antissepsia da borracha do frasco/ampola mesmo depois da retirada do lacre, antes da reconstituição e aspiração do medicamento;
- Proteja os dedos com algodão ou gazes ao quebrar o gargalo, evitando acidentes como cortes e possível contaminação;
- Abra as seringas sempre pelo lado do êmbolo (local correto de abertura da embalagem), evitando contaminá-las;
- Adapte a agulha ao bico da seringa, cuidando para não tocar em nenhuma das partes internas. Introduza a agulha na ampola, proceda a aspiração do conteúdo, invertendo lentamente a ampola sem encostar à sua borda. Dessa forma, previne-se contaminação da agulha e do medicamento;
- Utilize uma agulha para aspirar o medicamento do frasco/ ampola e outra para a administração, evitando iatrogenias com resíduos da tampa;
- Ao remover o ar do sistema de injeção (seringa e agulha), mantenha a agulha protegida;

8

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO



9

NÃO
MEDICAÇÃO



10

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO



11

ORIENTAÇÕES PARA ALTA





**CERTOS NO PREPARO
E ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS**

